

കേരളത്തിലെ നാടൻ വളർത്തു പക്ഷികൾ



കേരളത്തിൽ, മികച്ച വീടുവള്ളൂകളിലും പറമ്പിലും മുമ്പാക്കേ കോഴി, താറാവ് തുടങ്ങിയവയെ വളർത്തുന്നത് പണ്ട് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാംസം, മുട്ട് എന്നിവയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവന്നുപോൾ വാൺജൂട്ടിസ്ഥാനത്തിലും കോഴിവളർത്തലും മറ്റും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായിത്തുടങ്ങി. വീടുവള്ളൂകളിൽ വളർത്താനും വാൺജൂട്ടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്താനും കേരളത്തിലെ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരു പോലെ യോജിച്ചുവരാണ്. അതുപോലെ, നാടൻ പരിസ്ഥിതിയോട് വളരെ ഇണങ്ങുന്ന കുടനാട് താറാവുകളെയും മറ്റും നെൽകൂഷിയോടനുബന്ധമായി വളർത്താനാവും.

തലമുള്ളികോഴി (Tellicherry Chicken):

പേര് സൗചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, കേരളത്തിലെ കുള്ളുർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട തലമുള്ളിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഇനമാണ് തലമുള്ളി കോഴി. ഇപ്പോൾ ഇവ കുടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. കുള്ളുർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും

പോണിച്ചേരിയിലെ മാഹിയിലും ഇവ കണബുവരുന്നു. വളർത്തുകോഴികളുടെ പുർണ്ണിക്കും വിയായ 'Red Jungle Fowl' നോടിനും രൂപസാമ്പൂശ്മംഡ്. താരതമ്പേരു വലിപ്പം കുടുതലുള്ള ഇതിന്റെ തുവൽ കുറപ്പുന്നിരിമാണെങ്കിലും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തും പിൻവശത്തും വാലിലും തിളക്കമുള്ള നീലവർണ്ണ തിന്റെ കലർപ്പ് കാണപ്പെടുന്നു. ചിലത് കഴുത്തിൽ സംഖ്യാനിരിവും നീലനിരിവും കലർന്ന തുവലോടു കൂടിയവയാണ്. തൊലികൾ ചാരനിറമാണ്. കോഴി പുഴവ് ചുവന്നതും ദൃഢായിട്ടുള്ളതും വലിപ്പമേറിയ തുമാണ്. പുവൻകോഴികൾ നിവർന്നതും, പിടകോഴികൾ പിന്നിലേക്ക് തുഞ്ഞിക്കിടക്കുന്നതുമായ പുവാണുള്ളത്. ലക്ഷണമാണെന്ന തലമുള്ളി കോഴികൾ കുറപ്പ് കലർന്ന ചുവന്ന പുവാണുള്ളത്. ഒരു സ്തനം ചുവന്നതും ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ളതുമാണ്. ചെവിയുടെ ഭാഗം ചുവപ്പും നിറമാണ്. ചിലതിന് വെളുത്തതോ ക്രീം നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ അടയാളമുാക്കും. ചുണ്ടും കുള്ളും കുറപ്പും നിറമാണ്. മാംസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തലമുള്ളി കോഴിയെ പ്രധാനമായും വളർത്തുന്നത്. ആന്ത്രം, വിരശല്യം എന്നി രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള

പാരമ്പര്യ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുറസ്സായി വിട്ടാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത്. അവ പിക്കിപിക്കണ്ട് കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, പ്രാണികൾ, സാസ്യങ്ങൾ എന്നിവ കൈഴിക്കുന്നു. കോഴിത്തീറ്റയോന്നും സാധാരണ ധാന്യി ഇവയ്ക്ക് നൽകാറില്ല. തിനിപ്പീൽ നിന്നും 2-3 അടി ഉയരത്തിൽ തടിയിലുള്ള കുടുകളിൽ ഇവയെ വളർത്താം. കുടുക്കുങ്ങലേ ഇവ അടയിരുന്ന് വിരിയിക്കുന്നതിനാൽ ശൈലം മരണാനിരക്ക് കുറവാണ്.

കഴുത്തിൽ പുടയില്ലാത്ത കോഴി (Naked Neck Chicken)

കഴുത്തിൽ പുടയില്ലാത്ത കോഴികൾ താരതമ്പേരു വലിപ്പമുള്ളവയും കഴുത്ത് സിലിണ്ടർ ആകുത്തിയിലുള്ളവയുമാണ്. പേരു സൗചിപ്പിക്കും പോലെ ഇവയുടെ കഴുത്തിൽ പുടകാണപ്പെടുന്നില്ല. കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് നന്നുത്ത തുവൽക്കും കാണുന്നു. ചുട്ടിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള താപ നിയന്ത്രണ ജീനുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവയുടെ

കഴുത്തിൽ പുട കാണാമ്പുടാത്തത്. ഈ ജീവി നെ യുദ്ധസിലെ വൈറ്റ് ലഗേബൻ കോഴികളിൽ സന്നിവേശപ്പെട്ടിട്ടും പുതിയ ഇനങ്ങളെ ഉരുത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് ചുവർനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ പ്രധാനമായും കാണാമ്പുടുന്നത്. കുന്തമുങ്ഗളുായി 20 ആഴ്ചകൊണ്ട് ശരാശരി 1005 ശ്രാം വരെയാകുന്നു. മുട്ടയുടെ ശരാശരി ഭാരം 54 ശ്രാമാണ്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 99 മുട്ട കർശവരെയിടുന്നു. 66% പ്രജനനഗ്രഹിയുള്ള ഈ യുടെ 71% മുട്ടകളും അടവിരിയുന്നവയാണ്.

കുടനാടൻ താറാവ്

നെൽകൃഷിയും താറാവ് വളർത്തലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുടനാട്. നെൽപ്പൂട്ടതെത്തു കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് കുടനാടുകാർ അവയുടെ തന്ത്രിനമായ കുടനാടൻ താറാവുകുട്ട അഞ്ചെ പാടത്തെക്കിരിക്കുന്നു. പാടത്ത് അവശ്രേഷ്ഠി കുന്ന നെന്മാൻകിൾ ഇവ കൊതിതിനുകയും, അവയുടെ കാഷ്ഠം മണ്ണിൽന്ന് വളക്കുന്ന കുട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. കുടനാടൻ താറാവുകൾ ചാരനിറം, തവിട്ട്, ചെമ്പുനിറം, വൈള്ള, കരിപ്പ് എന്നീ നിന്നും തീലും പുള്ളിക്കളും കുട്ടകയും കാണാമ്പുടുന്നു. പുള്ളികൾക്കും നിറത്തിനുമനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക മായി ഈ ചാര, ചെമ്പി, തുവെള്ള, പുള്ളി, പാണി എന്നീ പേരുകളിലിട്ടുപ്പെടുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ പരിപാലനത്തിൽ വളരുന്ന കുടനാടൻ താറാവുകൾ പരിസ്ഥിതിയാം ഇനങ്ങി ജീവിക്കുന്നവയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പലഭാഗത്ത് ദേശാടന സന്ദർഭായ തത്തിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് വളർത്താവുന്നവയുമാണ്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 200 മുട്ടകളിടുന്ന ഇവയുടെ മുട്ടയുടെ ശരാശരി ഭാരം 70 ശ്രാമാണ്. വിരിഞ്ഞ് 129 ദിവസമാകുന്നോഴ്ക്കും ഇണയിനം താറാവുകൾ ആരുത്തെത്തു മുട്ടയിടുന്നു. 8 ആഴ്ച പ്രായമാകുന്നോ ഫേക്ക് ഇവയ്ക്ക് 2.2 കിലോഗ്രാമിൽ കുടുതൽ ശർഭാരമുണ്ടാകും.



തലപ്പേരിക്കോഴി



കഴുത്തിൽ പുടയില്ലാത്ത കോഴി



കുടനാടൻ താറാവ്



കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്
എൽ 14, ഒയ് നഗർ, മലിക്കൽക്കോളേജ് പി. ടി.
തിരുവനന്തപുരം 695011 ഫോൺ: 0471254740
www.keralabiodiversity.org
keralabiodiversity@gmail.com



കേരളത്തിലെ നാടൻ പുത്രന്തരു പക്ഷികൾ



കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്