

കേരളത്തിലെ നാടൻ വളർത്തു പക്ഷികൾ



കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്



കേരളത്തിലെ താടൻ വളർത്തു പക്ഷികൾ

കേരളത്തിൽ, മിക്ക വീട്ടുവളപ്പുകളിലും പറമ്പിലുമെക്കെ കോഴി, താനാവ് തുടങ്ങിയവയെ വളർത്തുന്നത് പണ്ട് സർവ്വ സാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാംസം, മുട്ട എന്നിവയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവന്നപ്പോൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോഴിവളർത്തലും മറ്റും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായിത്തുടങ്ങി. വീട്ടുവളപ്പുകളിൽ വളർത്താനും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്താനും കേരളത്തിലെ തനതീനങ്ങൾ ഒരു പോലെ യോഗിച്ചവയാണ്. അതുപോലെ, നാടിന്റെ പരിമ്പലിയിലോട് വളരെ ഇണങ്ങുന്ന കൂട്ടനാട് താനവുകളെയും മറ്റും നെൽകൃഷിയോടനുബന്ധമായി വളർത്താനാവും.

തലശ്ശേരിക്കോഴി (Tellichery Chicken)

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഇനമാണ് തലശ്ശേരി കോഴി. ഇപ്പോൾ ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ മഹിയിലും ഇവ കണ്ടുവരുന്നു. വളർത്തു കോഴികളുടെ പുരവിക ജീവിയായ 'Red Jungle Fowl' നോടിതിനു രൂപ സാദൃശ്യമുണ്ട്. താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടുതലുള്ള ഇതിന്റെ തൂവൽ

കറുപ്പു നിറമണെങ്കിലും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തും പിൻ വശത്തും വലിലും തിളക്കമുള്ള നീലവർണ്ണത്തിന്റെ കലർപ്പ് കാണപ്പെടുന്നു. ചിലത് കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണനിറവും നീലനിറവും കലർന്ന തൂവലോടു കൂടിയവയാണ്. തൊലിക്ക് ഛരണിറമാണ്. കോഴിപ്പൂവ് ചുവന്നതും റെഡ്യായിട്ടുള്ളതും വലിപ്പമേറിയതുമാണ്. പൂവൻകോഴിക്ക് നിവർന്നതും, പീടകോഴിക്ക് പിന്നിലേക്ക് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ പൂവണുളളത്.

ലക്ഷണമൊത്ത തലശ്ശേരി കോഴിക്ക് കറുപ്പു കലർന്ന ചുവന്ന പൂവണുളളത്. ഗളസ്തനം ചുവന്നതും ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ളതുമാണ്. ചെവിയുടെ ഭാഗം ചുവപ്പു നിറമാണ്. ചിലതിന് വെളുത്തതോ ക്രീം നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ അടയാളമുണ്ടാകും. ചുണ്ടും കണ്ണും കറുപ്പു നിറമാണ്.



മാംസത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തലശ്ശേരി കോഴിയെ പ്രധാനമായും വളർത്തുന്നത്. ആസ്ത്മ, വിരശല്യം എന്നീ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഫരമ്പ്രദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുറസ്സായി വിട്ടാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത്. അവ ചിക്കിചികഞ്ഞ കിട്ടുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, ഫ്രണിക്ൾ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷിക്കുന്നു. കോഴിത്തീറ്റയൊന്നും സാധാരണയായി ഇവയ്ക്ക് നൽകാറില്ല.



തന്നിരട്ടിൽ നിന്നും 2-3 അടി ഉയരത്തിൽ തടിയിലുള്ള കൂടുകളിൽ ഇവയെ വളർത്താം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവ അടയിരൂന്ന് വീശിയിക്കുന്നതിനാൽ ശൈശവ മരണനിരക്ക് കുറവാണ്.

കഴുത്തിൽ പൂടയില്ലാത്ത കോഴി (Naked Neck Chicken)

കഴുത്തിൽ പൂടയില്ലാത്ത കോഴികൾ താരതമ്യേന വലിപ്പമുള്ളവയും കഴുത്ത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ളവയുമാണ്. പേരു സൂചിപ്പിക്കുംപോലെ ഇവയുടെ കഴുത്തിൽ പൂട കാണപ്പെടുന്നില്ല. കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് നന്നുത്ത തൂവൽക്കൂട്ടം കാണുന്നു. ചൂടിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള താപനിയന്ത്രണ ജീനുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവയുടെ കഴുത്തിൽ പൂട കാണപ്പെടാത്തത്. ഈ ജീനിനെ യു.എസിലെ വൈറ്റ് ലഗോൺ കോഴികളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു പുതിയ ഇനങ്ങളെ ഉരുത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനങ്ങൾക്ക് ചൂടിനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി 20 ആഴ്ച കൊണ്ട് ശരീരഭാരം 1005 ഗ്രാം വരെയൊക്കുന്നു.

മുട്ടയുടെ ശരാശരി ഭാരം 54 ഗ്രാമാണ്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 99 മുട്ടകൾവരെയിടുന്നു. 66% പ്രജനനശേഷിയുള്ള ഇവയുടെ 71% മുട്ടകളും അടവീരിയുന്നവയാണ്.

കൂട്ടനാടൻ താനാവ്

നെൽകൃഷിയും താനാവ് വളർത്തലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കൂട്ടനാട്. നെൽപ്പാടത്തെ കൈയ്ത്തു കഴിഞ്ഞത് കൂട്ടനാട്ടുകാർ അവരുടെ തനതായ കൂട്ടനാടൻ താനാവുകൂട്ടങ്ങളെ പാടത്തേക്കിറക്കുന്നു. പാടത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന നെൽമണികൾ ഇവ കൊത്തിതിന്നുകയും, അവയുടെ കാഷ്ഠം മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടനാടൻ താനാവുകൾ ചാരനിറം, തവിട്ട്, ചെമ്പുനിറം, വെള്ള, കറുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലും പുള്ളികളോടു കൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു. പുള്ളികൾക്കും നിറത്തിനുമനുസരിച്ച് പ്രാദേശികമായി ഇവ ചാര, ചെമ്പല്ലി, തൂവെള്ള, പുള്ളി, പാണ്ടി എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്നു.

വളരെ കുറഞ്ഞ പരിപാലനത്തിൽ വളരുന്ന കൂട്ടനാടൻ താനാവുകൾ പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നവയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പലഭാഗത്ത് ദേശാടന സമ്പ്രദായത്തിൽ കൊണ്ടുനടന്ന് വളർത്താവുന്നവയുമാണ്. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 200 മുട്ടകളിടുന്ന ഇവയുടെ മുട്ടയുടെ ശരാശരി ഭാരം 70 ഗ്രാമാണ്. വീരിഞ്ഞത് 129 ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ഹായിനം താനാവുകൾ ആദ്യത്തെ മുട്ടയിടുന്നു. 8 ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇവയ്ക്ക് 2.2 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ശരീരഭാരമുണ്ടാകും.



കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്
എൽ 14, ജയ് നഗർ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. 63.
തിരുവനന്തപുരം 695011 ഫോൺ: 04712554740
www.keralabiodiversity.org
keralabiodiversity@gmail.com